

HRA NILNA VREDNOST

	na 100g praška	na 100ml pripravljene obroka
Energijska vrednost	kJ 2121	305
	kcal 507	73
Maščobe (47% kcal), od tega:	g 26,4	3,8
- nasičene maščobne kisline	g 10,8	1,6
- srednjeverzični trigliceridi (MCT)	g 3,3	0,5
- enkrat nenasičene maščobne kisline	g 8,1	1,2
- večkrat nenasičene maščobne kisline	g 5,6	0,8
- α -linolenska kislina (omega-3)	mg 42,0	6,1
- dokozahexaejskojska kislina (DHK) (omega-3)	mg 126	18
- linolna kislina (omega-6)	mg 4800	691
- arahidonska kislina	mg 126	18
Ogljikovi hidrati (42% kcal), od tega:	g 53,2	7,7
- sladkorji	g 38	5,5
- laktoza	g 37	5,3
Beljakovine (11% kcal)	g 14,2	2,0
Sol	g 0,61	0,09
Natrij	mg 245	35
Kalij	mg 570	82
Klorid	mg 475	68
Kalcij	mg 570	82
Fosfor	mg 345	50
Magnezij	mg 47	6,8
Železo	mg 8,3	1,2
Cink	mg 4,0	0,58
Baker	mg 0,40	0,06
Mangan	μ g 145	21
Fluorid	μ g <60	<8,6
Selen	μ g 30	4,3
Krom	μ g <30	<4,3
Molibden	μ g <30	<4,3
Jod	μ g 105	15
Vitamin A	μ g RE 470	68
Vitamin D	μ g 13	1,8
Vitamin E	mg TE 6,2	0,89
Vitamin K	μ g 30	4,3
Vitamin C	mg 118	17
Vitamin B1 (tiamin)	mg 0,40	0,06
Vitamin B2 (riboflavin)	mg 1,1	0,16
Niacin	mg 3,7	0,53
Vitamin B6	mg 0,3	0,04
Folat	μ g DFE 155	22
Vitamin B12	μ g 1,6	0,23
Biotin	μ g 8,7	1,3
Pantotenska kislina	mg 3,5	0,50
Tavrin	mg 25	3,6
Karnitin	mg 20	2,9
Holin	mg 170	24
Inozitol	mg 135	19

Osmolarnost: 278 mOsm/l • Velikost merice: 4,8 g praška • 100 ml = 14,4 g praška (3 merice) + 90 ml vode

Nestlé
PreNAN

(SLO) ŽIVILO ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE

Za uravnavanje prehrane pri nedonošenčkih in dojenčkih z nizko porodno težo po odpustu iz bolnišnice

Sestavine: laktoza, rastlinska olja (sončnično, palmino, kokosovo, ogriščino olje z malo eruka kisline, sončnično olje bogato z oleinsko kislino), maltodekstrin, izolat hidroliziranih beljakovin **sirotke**, koncentrat hidroliziranih beljakovin **sirotke**, minerali (kalcijev glicerofosfat, kalcijev klorid, magnezijev klorid, kalijev klorid, natrijev citrat, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, mangancov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), srednjeverzični trigliceridi (MCT), **ribye** olje (DHK), holin bitaratar, olje iz glive *Morierella alpina* (ARA), vitamini [C (natrijev L-askorbat), E (D,L α -tokoferil acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kislina (kalcijev D-pantonat), B2 (riboflavin), A (retinil acetat), B1 (tiamin mononitrat), B6 (piridoksin hidroklorid), folna kislina, vitamin K (filokionin), D (holekalciferol), D-biotin, B12 (cianokobalamin)], inozitol, L-arginin, tavrin, L-karnitin, kultura *Bifidobacterium lactis*. Količina kulture *Bifidobacterium lactis* min 1x10⁸ cfu/g.

POMEMBNO OPOMBA: Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke in dojenje naj traja čim dlje. Preden se odločite za uporabo tega izdelka, se posvetujte z zdravnikom.

PreNAN[®] je treba uporabljati pod zdravniškim nadzorom. Pripravek je primeren kot edini vir hrane prinedonošenčkih in dojenčkih z nizko porodno težo. Izdelek vsebuje beljakovine sirotke kравega mleka. Za prehod na drugo mlečno formulo s pripravka PreNAN[®] se posvetujte z zdravnikom v skladu s potrebami in razvojem otroka.

PreNAN[®] je namenjen samo za peroralno uporabo.

VEČ KOT
155 LET VODILNI V ZNANOSTI

V 155 letih martijevga dela in izkušenj je družba Nestlé[®] postavila temelje raziskovanja in inovacij v prehrani dojenčkov in majhnih otrok.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. • **Uporabno najmanj do konca:** glejte oznako odtisnjeno na dnu embalaže. • **Odprt izdelek je uporaben 4 tedne.** • Shranjujte na suhem in hladnem mestu.

Brezplačna telefonska številka za informacije: 080 4505
info@si.nestle.com



NUTRITIONAL COMPASS[®]
* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

e 400g



D125176935L0A

OD ROJSTVA dalje

PreNAN[®] je živilo za posebne zdravstvene namene, ki zagotavlja ustrezno količino hranil potrebnih za hiter razvoj nedonošenčkov ali dojenčkov z nizko porodno težo, večjo od 1.800 g. Uporaba PreNAN[®] po odpustu lahko povzroči hitrejšo rast v dolžino in težo v primerjavi s standardno formulo za dojenčke (tudi do 9 mesecev starosti). PreNAN[®] zagotavlja ustrezno energijo in vsebnost beljakovin za okrevanje in rast otroka po odpustu iz bolnišnice, ali od 6. meseca vzporedno z dopolnilno prehrano.

Kontraindikacije: Pripravka PreNAN[®] ne uporabljajte v primeru alergije na beljakovine kравega mleka, GALAKTOZEMIE ali malabsorpcije GLUKOZE/GALAKTOZE.

Pripravljatelj: Nestlé Deutschland, Biessenshofen, Fussener Str. 1, 87640 Biessenshofen, Nemčija
Distributer: INSPHARMA d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana



- ✓ Za dojenčke s težo > 1.800 g
- ✓ Hidrolizirane beljakovine, lahko prebavljive
- ✓ DHK in ARA
- ✓ MCT in strukturalni lipidi
- ✓ B. lactis

NAVODILA ZA PRIPRAVO



1. Pred pripravo obroka za dojenčka si skrbno umijte roke.



2. Stekleničko, dudo in pokrovec temeljito operite, dokler ne ostanje sledi pripravka. Popolnoma jih potopite pod vodo. Zavrete vodo, ves pribor prekuhajte še 5 minut. Poškodba ni ostanje pokrita do uporabe.**



3. Prekuhajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite največ na 40 stopinj celzija.



4. Strogo upoštevajte način priprave. Najprej v stekleničko nalijte mlečno vodo. Nato samo z merilno žličko dodajte prašek in previdno poravnajte odvečni prašek.



5. Po vsaki uporabi embalažo zaprite in shranite na hladnem in suhem mestu. Prepričajte se, da je žlička suha in jo shranite nazaj v skatlo.



6. Zaprite steklenico in dobro pretresite, dokler se prašek popolnoma ne raztopi. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.

**Če uporabljate parni sterilizator, upoštevajte navodila proizvajalca.

OPAZORILLO: Zaradi neprekuhanja vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš otrok zboli. Nepravilno shranjevanje, rokovanje, priprava in hranjenje lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka. Vedno pripravite samo eno stekleničko naenkrat. Nato otroka takoj nahranite po navodilih. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite in ga pri hranjenju pazljivo spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve.

PREGLEDNICA HRANJENJA

Teža dojenčka v gramih	Količina za en obrok***		Število potrebnih obrokov dnevno***
	Prekuhana voda v ml*	Število meric**	
1800-3000	V skladu s priporočili zdravnika		
3000-4000	90	3	6
4000-5000	120	4	6
5000-6000	150	5	5
6000-7000	150	5	5
7000-8000	180	6	4

*Pred dodatkom praška je potrebno prekuhana vodo ohladiti na ~40 °C, zato da se ohrani število živih bakterij *Bifidobacterium lactis*. Z zdravnikom se posvetujte, ali je voda iz vodovoda primerna za pripravo obroka. **Uporaba večje ali manjše količine praška od priporočene lahko vodi v dehidracijo ali neustrezno prehranjenost otroka. Priporočene količine ne smete spreminjati, razen če ste se tako dogovorili z zdravnikom. ***Glede na navodila zdravnika.