

BebiCol® s cinkom

Lactaseibacillus rhamnosus GG
s cinkom in vitaminom D3

BebiCol® s cinkom, raztopina za peroralno uporabo je prehransko dopolnilo, ki vsebuje kulturo koristnih bakterij *Lactaseibacillus rhamnosus GG*, vitamin D3 in cink, namenjeno novorojenčkom, dojenčkom in majhnim otrokom. Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti in prispeva k delovanju imunskega sistema. Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Aktivne sestavine	1 odmerek (14 kapljic)	PDV* 14 kapljic	100,0 g
Liofilizirana kultura koristnih bakterij <i>Lactaseibacillus rhamnosus GG</i>	min. 1×10^{10} živih celic	**	min. 213×10^9 živih celic
Vitamin D3 (holekalciferol)	10,0 µg	200 %	2,13 mg
Cink (cinkov citrat dihidrat)	0,6 mg	6 %	0,13 g
Vitamin E (α-tokoferol)	0,005 mg	0,04 %	1,00 mg

*PDV – priporočeni dnevni vnos za odraslo osebo **dnevni vnos ni določen

Odmerjanje: Novorojenčki, dojenčki in otroci: Enkrat na dan po 14 kapljic. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Izdelek vsebuje usedlino. Stekleničko je potrebno pred vsako uporabo dobro pretresti. Po stresanju je vsebina stekleničke motna. V posameznih primerih lahko pride do delnega strjevanja in zadrževanja vsebine v pipeti. Ta pojav ne vpliva na kakovost izdelka niti na njegovo pravilno uporabo in odmerjanje. Najbolje je kapljice vzeti samostojno na žlički. Kapljice se lahko zameša v hrano, mleko in mlečne formule ter pijačo. Pipete ni treba uporabljati za mešanje kapljic BebiCol® z drugo tekočino ali hrano. Po odprtju stekleničke se lahko izdelek zaužije še najmanj 30 dni. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za zdravje sta zelo pomembna raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

Opozorilo: Ne vsebuje alergenov (mlečne beljakovine, laktoza, gluten, jajca, ribe, arašidi, sezam, žveplov dioksid, soja, oreščki, zelena, gorčica, raki).

Izdelka ne smejo jemati osebe, ki so preobčutljive na katero koli sestavino izdelka. Kadar se koristne bakterije jemljejo skupaj s peroralnim antibiotikom, jih je treba vzeti vsaj 2 uri pred ali 2 uri po jemanju antibiotika. Jemanje ni priporočljivo pri osebah z oslABLJENIM imunskim sistemom ali na imunosupresivni terapiji, vključno pri otrocih z alograftom, v primeru krvave driske in otrocih s centralnim venskim katetrom. Skupaj s tem izdelkom ne jemljite drugih dodatkov vitamina D.

Shranjevanje: Izdelek shranjujte v originalni embalaži, zaščiten pred svetlobo in vlago, pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte nedosegljivo otrokom!

BebiCol® s cinkom je izdelan v skladu z dobro proizvodno prakso in HACCP načeli. Proizvedeno v Republiki Srbiji.

Proizvajalec: Abela Pharm d.o.o., Viline vode bb, 11000 Beograd, Srbija. Telefon: +381 (0)11 20 70 801

UVOZNIK in DISTRIBUTER: Abela Pharm d.o.o., Radnička cesta 218, 10000 Zagreb, Hrvaška.

info@abelapharm.si

datum revizije: 01/2026


AbelaPharm

2102024



Prehransko dopolnilo